

UN PLÉCOPTÈRE (INS. NÉVR.) NOUVEAU DE FRANCE.

PAR LE R. P. LONGIN NAVÁS, S. J.,

CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Hemimelæna (Perla) Revelierei sp. nov. (Perlidae).

Similis *flaviventri* Hoffm., major.

Caput inferne fusco-fulvum, superne fuscum, sublæve, ante M breviter fulvo pilosum; fascia media longitudinali pone ocellum anticum flavida, ante apicem constricta, apice dilatata, fere in formam calicis desuper visa, flavo-olivacea, M et callis nigris, nitidis; ocellis in triangulum latum dispositis, posticis duplo inter se quam ab oculis, sesqui quam ab anterioribus distantibus, nigris; oculis nigris; palpis fusco-nigris; antennis fusco-nigris, articulo primo grandi, sequentibus in tertio basilari transversis, ceteris longioribus quam latioribus.

Prothorax capite angustior, subrectangularis, retrorsum vix angustatus, inferne fuscus, superne rugosus, fuscus, fascia media longitudinali angusta in præscuto mesonoti continuata et plaga laterali parum definita, flavo-olivaceis; meso et metathorax fusco-nigri.

Abdomen totum fusco-nigrum, fulvo leviter breviterque pilosum, ultimo tergito fusco-fulvo; cervis fulvis, fulvo pilosis, lobo basilari apice tuberculiformi, tuberculo nigro, pilis fulvis radiantibus; articulis primis transversis, ceteris elongatis, apice fuscis. Pedes fusco-fulvi, inferne pallidiores.

Alæ hyalinæ, levissime olivaceo tinctæ, area apicali plerumque 2 venulis; sectore vadii ultra anastomosis plerumque ter furcato; venulis anastomosis (radiali et intermedia) proximis, haud in lineam vertam continuatis.

Ala anterior reticulatione fusca, forti; area costali fere 6 venulis, pro-cubitali 7-8, cubitali fere 8; vena axillari prima a secunda magis distante quam a postcubitali.

Ala posterior reticulatione subtota olivaceo-pallida, ad alæ apicem in area

costali et sectore radii ultra anastomosim fusca; fere 5 venulis cubitalibus; axillari prima semel furcata.

	millimètres.
Long. corp. ♂	10,5
Long. al. ant.....	14,5
Long. al. post.....	11,9

Patria. Saint-Nazaire, mars 1916, G. Revelière leg. (Coll. m.).

Je profiterai de cette occasion pour citer encore les Trichoptères de la même région qui m'ont été envoyés dernièrement par M. Revelière et qui méritent d'être connus.

FAMILLE DES **LIMNOPHILIDES.**

Limnophilus affinis Curt. Saint-Nazaire, 8 avril.

Limnophilus rhombicus L. Saint-Nazaire, 12 mai.

Limnophilus sparsus Curt. Blain (Loire-Inf.) mai, juillet; Forêt du Gâvres, juillet 1916.

Stenophylax permistus Mac Lachl. Blain, mai; Saint-Nazaire, 15 avril.

FAMILLE DES **SÉRICOSTOMIDES.**

Notidobia ciliaris L. Blain, 27 avril.

FAMILLE DES **LEPTOCÉRIDES.**

Leptocerus fulvus Ramb. Blain, juillet.

FAMILLE DES **PSYCHOMIIDES.**

Tinodes Vaneri L. Blain, 1^{er} mai 1915.

Saragosse, 12 décembre 1916.